

Úlceras en pie en paciente joven no diabético

Sánchez Prieto, Yasmina (1). Pérez Pañart, Isabel (2).
Ramírez Domínguez, Natalia (3). Jiménez Casado, María Mercedes (4). Mateo Segura, Zoraida (5).
Moreno Juste, Aída (6).



Varón 29 años, sin AP de interés. Antecedente quirúrgico de amputación de 1º, 3º y falange distal de 4º dedo pie izquierdo hace dos años.

MC: heridas ulceradas en ambos pies.

EF: Pie izquierdo con úlceras con fibrina en base de 3º dedo profunda, que afecta a cara posterior, necrosis de falange media de 4º dedo. Eritema y edema del antepié. Pie derecho con úlcera necrótica en cara dorsal de 4º dedo con inflamación y úlcera en 2º dedo.

Juicio clínico: Isquemia arterial crónica grado IV en miembros inferiores.

Evolución: microscópicamente cambios inespecíficos isquémicos, con edema, congestión vascular, ulceración cutánea superficial y focos de exposición ósea con necrosis. Con todo ello se concluyó que presentaba criterios diagnósticos con alta probabilidad de tromboangieitis obliterante.

Conclusiones: La importancia de la prevención primaria y secundaria de los factores de riesgo cardiovascular, en este caso consumo de tabaco, causa fundamental de ésta enfermedad y único tratamiento efectivo que ha mostrado evidencia.